

CRIBELLATE SPINNEN OF WOLDRAADSPINNEN

ERESIDAE OF KOEPELSPINNEN (fig 15)

Kopborststuk rechthoekig. Lichaam zwart en fluweelachtig behaard. Achterlijf bij mannetjes rood met zwarte stippen. Slechts twee soorten die op het zicht niet van elkaar te onderscheiden zijn. Meest voorkomende vertegenwoordiger :

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze 1778) Lentevuurspin

AMAUROBIIDAE OF NACHTKAARDESPINNEN (fig 12)

Peervormig kopborststuk met een verhoogd donker kopgedeelte. Achterlijf met een tekening. Stevige poten en cheliceren. De spin maakt op muren een web van "Brussels kant" dat blauwachtig oplicht bij beschijning. Meest voorkomende vertegenwoordiger :

Amaurobius similis (Blackwall 1861) Muurkaardespin

TITANOECIDAE OF ROTSKAARDESPINNEN

Bruinachtige kaardespin waarvan het mannetje vier witte vlekken op het achterlijf heeft. Werd vroeger ingedeeld bij de AMAUROBIIDAE of NACHTKAARDESPINNEN. Moeilijk te vinden voor de leek. Slechts één soort :

Titanoeca quadriguttata (Hahn 1833) Rotskaardespin

DICTYNIDAE OF KAARDERTJES (fig 13)

Spinnen tot 4 mm. Lichaam fluweelachtig behaard. Achterlijf meestal met een tekening. Bouwen woldraadwebben op bladeren, struiken of op de grond. Meest voorkomende vertegenwoordiger :

Dictyna uncinata Thorell 1856 Struikkaardertje

OECOBIIDAE OF SPIRAALSPINNEN

Slechts één kleine (tot 2,5 mm) soort. Bleekoker tot geel van kleur met zwarte tekening op kopborststuk. Geringde poten. Maken kleine webjes binnenshuis. Moeilijk te vinden.

Oecobius navus Blackwall 1859 Huispiraalspin

ULOBORIDAE OF WIELWEBKAARDESPINNEN (fig 14)

Lichaam dichtbehaard. Bouwen een kaardewielweb of één sector daarvan. Slechts drie soorten. De spinnen die een volledig, min of meer horizontaal, wielweb bouwen hangen ondersteboven onderaan dit web. De spinnen die een sector spinnen, maken deel uit van het web. Zeldzaam.