

ECRIBELLATE SPINNEN OF KLEEFDRAADSPINNEN

HAPLOGYNE SPINNEN OF ZES-OGIGE SPINNEN
4 families

OONOPIDAE OF DWERGCELSPINNEN (fig 10)

Kleine spinnen (tot 3mm) Overdag bewonen ze kleine woonspinsels. Roze van kleur.
Slechts twee soorten. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Oonops pulcher Templeton 1835 Gewone dwergzesoog

SCYTODIDAE OF LIJMSPUITERS (fig 11)

Slechts één soort met een onmiskenbaar uiterlijk. Kopborststuk en achterlijf allebei rondig met heel tengere poten. Okerbruin met zwarte tekening.
Scytodes thoracia (Latreille 1802) Getijgerde lijmspuiters

DYSDERIDAE OF CELSPINNEN (fig 7)

Roodachtige spinnen. Cheliceren zeer groot. Kopborststuk stevig. Lichaam lijkt onbehaard. Alle zes ogen in één groepje. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Dysdera crocota C.L. Koch 1838 Roodwitte celspin

SEGESTRIIDAE OF ZESOOGSPINNEN (fig 9)

Cheliceren groot. Kopborststuk stevig. Achterlijf met tekening. De zes ogen niet in één groepje zie fig 8. Leven in spleten of holletjes van waaruit er struikeldraden vertrekken. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Segestria senoculata (Linnaeus 1758) Boomzesoog

ENTELEGYNE SPINNEN OF ACHT-OGIGE SPINNEN
Blad 4