JAGERS

Spin leeft ONDER water ?

JA →

CYBAEIDAE OF WATERSPINNEN (fig 48)
Kopborststuk met een verhoogd kopgedeelte. Achterlijf onder water voorzien van een luchtbel. Leeft in een spinselklok onder water. Slechts één soort :
Argyroneta aquatica (Clerck 1757) Waterspin

NEEN ↓

Jagers met een duidelijk lichaamskenmerk of vorm ?

JA →

SALTICIDAE OF SPRINGSPINNEN (fig 18)
Lichaamsvorm min of meer zoals fig 18. Ogenstand zoals fig 19. Kopborststuk min of meer rechthoekig met stevige, robuste poten. Het ogenveld neemt bijna de helft van het kopborststuk in. Springende dieren.
Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Salticus scenicus (Clerck 1757) Harlekijn

NEEN →

THOMISIDAE OF KRABSPINNEN (fig 2O)
Lichaamsvorm min of meer zoals fig 20. Ogenstand zoals fig 21. Kopborststuk blokkig en achterlijf druppelvormig. PI, PII langer dan de overige poten. Lopen bij verstorig zijwaarts zoals krabben doen. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Xysticus cristatus (Clerck 1757) Gewone krabspin

PHILODROMIDAE OF RENSPINNEN (fig 22)
Lichaamsvorm min of meer zoals fig 22. Ogenstand zoals fig 23. Lijken op krabspinnen, maar doen niet zo “krabachtig” aan. Kleine, heel vlugge spinnen. Werden vroeger bij de THOMISIDAE of KRABSPINNEN ingedeeld. Meest voorkomende vertegenwoordiger :
Philodromus cespitum (Walckenaer 1802) Gewone renspin

OXYOPIDAE OF LYNXSPINNEN (fig 38)
Lichaamsvorm min of meer zoals fig 38. Ogenstand zoals fig 39. Poten opvallend en onmiskenbaar overvloedig bestekeld. Slechts een paar heel zeldzame soorten in de Benelux.

ANYPHAENIDAE OF BUISSPINNEN (fig 29)
Lichaamsvorm zoals fig 29 met een specifieke tekening op het achterlijf zie fig 30. Slechts één soort :
Anyphaena accentuata (Walckenaer 1802) Struikspin

Blad 7